

問題番号	模範解答
問題1	4
問題2	1
問題3	3
問題4	4
問題5	3
問題6	3
問題7	2
問題8	4
問題9	1
問題10	1
問題11	1
問題12	1
問題13	1
問題14	3
問題15	1
問題16	4
問題17	4
問題18	3
問題19	2
問題20	3
問題21	3
問題22	4
問題23	4
問題24	3
問題25	1

問題番号	模範解答
問題26	3
問題27	1
問題28	1
問題29	1
問題30	3
問題31	3
問題32	3
問題33	3
問題34	3
問題35	3
問題36	1
問題37	1,2
問題38	1
問題39	3,5
問題40	2
問題41	4
問題42	3
問題43	2
問題44	4
問題45	2

記述式解答
問題46
<p>1. ファロー四徴症の概要</p> <p>①肺動脈狭窄 ②大動脈騎乗 ③心室中隔欠損 ④右心室肥大</p> <p>肺動脈狭窄、寝室中隔欠損のため右心室の静脈血が大動脈に流れてチアノーゼを呈する 無酸素発作(チアノーゼの増強、呼吸困難、意識消失)</p> <p>1. 看護</p> <p>①症状の観察・バイタルサイン測定 ②心臓の負担軽減</p> <p>は排便・運動・興奮などが誘因になる 安静の工夫 啼泣の原因を素早く把握し、おむつ交換やミルクの時間、だっこでなだめる おしゃぶり、スイングクラッチ、音楽、ビデオなどの工夫 呼吸困難の緩和(気道分泌物除去、安静な体位など) 排便のコントロール</p>