



frightening reactions towards the caregiver (Main and Hesse 1990). Children of parents with severe psychopathology and maltreated children often show these disorganized attachment behaviors (Radke-Yarrow et al. 1985; Van IJzendoorn et al. 1999). Thus, attachment relationships can be classified as secure, insecure-avoidant, insecure-ambivalent, and insecure-disorganized attachment.

出典) Spruit, A., Goos, L., Weenink, N., Rodenburg, R., Niemeyer, H., Stams, G. J., & Colonna, C. (2020). The relation between attachment and depression in children and adolescents: A multilevel meta-analysis. *Clinical child and family psychology review*, 23, 54-69.

問題1 下線部(1)は、どのようにして形成されると述べられているか、日本語で書きなさい。

問題2 以下の記述の中から、不安定な愛着形成のリスク要因として本文に挙げられていないものを一つ選びなさい。

- ① 養育者の感受性が欠如していること。
- ② 養育者が子どもの求めに敏感に反応できないことが多いこと。
- ③ 養育者が子どもに対して恐怖を抱いていること。
- ④ 養育者の感受性に一貫性がないこと。
- ⑤ 養育者と子どもの分離期間が長いこと。

問題3 先行研究によると、不安定な愛着を形成している子どもはどのようなリスクがあると述べられているか、日本語で書きなさい。

問題4 下線部(2)は、どのような目的で開発されたと述べられているか、日本語で二つ書きなさい。

問題5 下線部(3)を日本語で説明しなさい。

問題6 下線部(4)を和訳しなさい。

問題7 タイプDは、どのような子どもたちに見られることが多いと述べられているか、日本語で書きなさい。